

Mga Tugon sa Pag-iwas ng Impeksyon sa Paaralan

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応について (お願い)

Nais namin ipaalang sa inyo sa pagbabago (may salungguhit) at mga mahalagang impormasyon tungkol sa pag-iwas ng impeksyon tulad ng mga sumusunod.

HAKBANG SA PAARALAN

1. Pagmonitor ng kalusugan gamit ang health check card

(1) Pagmonitor ng kalusugan

- ① Mag-sukat ng lagnat, i-check ang kondisyon ng kalusugan at sulatan ang card.
- ② Pirmahan (o gumamit ng seal) ang card bago ipadala sa inyong anak sa paaralan.
- ③ **Dinagdag sa health check card ang “diarrhea at iba pang sintomas sa gastrointestinal (hindi pangkaraniwang sintomas)” mula Setyembre. (※ isulat sa card kung nagkaroon ng sintomas).**

(2) Pagsumite ng card pagkatapos ng bakasyon

- ① Patuly ang sukatin ang lagnat at i-check ang kondisyon kalusugan kahit Sabado, Linggo o holiday.
- ② Ipaalala sa inyong anak na isumite ang card sa paaralan sa Lunes o pagkatapos ng bakasyon.

2. Kung nagkaroon ng sintomas

(1) Kung nilagnat o nagkaroon ng sintomas na inilarawan sa health check card habang nasa paaralan

⇒ ① Sunduin ang bata.

② Sunduin din ang mga kapatid ng bata.

Sa kasong may kapatid na nag-aaral sa ibang paaralan tulad ng elementarya, sekondarya at iba pa, tawagan ang paaralan para sunduin.

③ Sunduin ang bata (pati mga kapatid) at dalhin sa ospital/clinic.

(2) Kung nag-absent ang bata sa paaralan dahil may sintomas

① Manatili sa bahay pati na rin ang mga kapatid. (isaalang-alang ito bilang suspension sa attendace)

② Maaari ng pumasok ang mga kapatid mula sa araw pagkatapos lumipas ang sintomas ng bata.

★ Ang bata ay kailangan manatili sa bahay hanggang sa tiyak na panahon (inerekomenda na 2~3 araw) pagkatapos mawala ang sintomas. Ngunit, mahalagang sundin ang payo ng doktor.

Paalala: (1) at (2) na nakasaad sa itaas

Kung diagnose ng doktor ay malinaw na “Nilagnat dahil sa kronikong sakit”, hindi kailangan manatili sa bahay.

3. PCR test ng bata

(1) Kailangan manatili sa bahay hanggang lumabas ang resulta. Ngunit, ang panahon ng “manatili sa bahay” ay maaaring magkakaiba depende sa kadahilan ng pagsusuri “upang masigurado” o “close-contact”. Sa kasong ito, sumunod sa utos ng public health center.

(2) Kung ang bata ay na-close contact sa miyembro ng pamilya (kasama sa bahay) na tumanggap ng PCR test dahil sa “upang masigurado” o “close contact”, kailangan manatili sa bahay hanggang lumabas ang resulta.